

PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII - BADANIE WYKONYWANE PO POŁUDNIU

Schemat przygotowania jelita grubego preparatem Fleet Phospho-soda

- Na **trzy dni** przed planowaną kolonoskopią **nie należy spożywać** sałatek jarzynowych, owoców pestkowych (np. winogron, pomidorów, kiwi, truskawek) oraz pestek siemienia lnianego i maku.
- Przed zastosowaniem preparatu Fleet Phospho-soda prosimy o przeczytanie ulotki informacyjnej dołączonej do preparatu.

Jeśli badanie będzie wykonywane w **godzinach popołudniowych**:

- przyjmowanie preparatu Fleet należy zacząć w **dniu poprzedzającym badanie o godz. 19:00**.

- w dniu poprzedzającym badanie rano można przyjąć bardzo delikatne śniadanie, na obiad klarowną zupę (bez makaronu, ryżu, innych dodatków) oraz wodę mineralną bez ograniczeń

- kolejną dawkę preparatu Fleet należy przyjąć w **dniu badania o g. 7:00**

- W dniu badania **nie należy przyjmować** jakichkolwiek posiłków.

UWAGI

1. Osoby z chorobami wymagającymi stałego, regularnego przyjmowania leków (np. nadciśnienie tętnicze, choroby serca, padaczka i inne) w dniu badania powinny zażyć poranną dawkę leku popijając niewielką ilością wody.
2. Osoby chorujące na cukrzycę powinny dodatkowo skonsultować z lekarzem sposób przygotowania do badania oraz poinformować o cukrzycy lekarza kierującego i rejestrację pracowni.
3. Osoby przyjmujące leki obniżające krzepliwość krwi (np. acenocumarol, sintrom, ticlid lub aspiryna, acard, acesan i inne) powinny przerwać ich stosowanie na 7 dni przed badaniem; należy to jednak **wcześniej skonsultować z lekarzem prowadzącym**. Konieczna może być zmiana tych leków na heparynę niskocząsteczkową (np. Fraxiparyna, Clexane).
4. Prosimy o przyniesienie i pokazanie lekarzowi przed badaniem posiadanej dokumentacji medycznej np. kart wypisowych z leczenia szpitalnego, opisów poprzednio wykonanych badań endoskopowych, aktualnych wyników badań laboratoryjnych takich jak: morfologia, elektrolity.
5. Pacjenci powinni dokładnie znać nazwy i dawki przyjmowanych leków lub posiadać ich spis.
6. Prosimy o przybycie z osobą towarzyszącą na badanie kolonoskopowe wykonywane w znieczuleniu.
7. Wyznaczona godzina badania może ulec przesunięciu ponieważ czas trwania kolonoskopii jest trudny do przewidzenia.